

モンカットフロアブル

[フルトラニル水和剤]

農林水産省登録 第16706号

有効成分 フルトラニル…20.0%

性状 類白色水和性粘稠懸濁液体

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称） 危険物：- 有効年限：3年 包装：500ml×20、20ℓ×1 RACコード：殺菌[7]

特長

- 稲体への浸透移行性に優れ、稲紋枯病に対して優れた効果が長期間持続する。
- 稲紋枯病に対して菌糸生育阻止、侵入菌糸形成阻止の力が強いいため、予防効果とともに感染後の治療効果も有する。
- 無人ヘリコプターによる散布にも使用できる。

効果、薬害等に関する注意事項

- 希釈して使用する場合は、使用量に合わせて薬液を調製し、使いきる。また、原液で使用する場合は、使用量に合わせて秤量し、使いきる。
- 本剤を空中散布及び無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意を守る。
 - 1) 散布は散布機種種の散布基準に従って実施する。
 - 2) 無人航空機による散布にあつては散布機種種に適合した散布装置を使用する。
 - 3) 散布中、薬液が漏れないように機体の散布用配管、その他散布装置の十分な点検を行う。
 - 4) 散布薬剤の飛散によって自動車やカラートタンの塗装等に影響を与えないよう散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意する。
 - 5) 水源池、飲料用水等に本剤が飛散流入しないように十分注意する。
 - 6) 散布終了後は次の項目を守る。
 - (a) 使用後の空容器は圃場などに放置せず適切に処理する。
 - (b) 機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理する。
- 本剤を本田の水稻に対して希釈倍数300倍で散布する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を使用する。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。

安全使用上の注意事項

- 眼に対して弱い刺激性があるので、眼に入らないように注意する。眼に入った場合には直ちに水洗する。

水産動植物に対する注意事項

- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しない。
- 空中散布及び無人航空機による散布で使用する場合は、河川、養殖池等に飛散しないよう特に注意する。

適用内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルトラニルを含む農薬の総使用回数	
稲	紋枯病	1000～1500倍	60～150ℓ/10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	4回以内	
		300倍	25ℓ/10a					
		原液	120ml/10a					
		30倍	3ℓ/10a					
	紋枯病 疑似紋枯症 (褐色菌核病菌) 疑似紋枯症 (赤色菌核病菌) 疑似紋枯症 (褐色紋枯病菌)	8倍	800ml/10a			無人航空機による散布		
		疑似紋枯症 (褐色菌核病菌) 疑似紋枯症 (赤色菌核病菌) 疑似紋枯症 (褐色紋枯病菌)	1000倍			60～150ℓ/10a		散布

製品写真



最新の登録内容はこちら

