

モンカット粒剤

[フルトラニル粒剤]

農林水産省登録 第16796号

有効成分 フルトラニル…7.0%

性状 類白色細粒

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）
RACコード：殺菌[7]

危険物：- 有効年限：5年 包装：3kg×8

特長

- 稲紋枯病に対して菌糸生育阻止、侵入菌糸形成阻止の力が強いいため、予防効果とともに感染後の治療効果も有する。
- 稲紋枯病の水平進展期から垂直進展初期まで処理適期幅が広く、余裕を持って使用できる。
- ねぎ白絹病に対して優れた防除効果を示し、粒剤のためドリフトなどの影響も少ない。

効果、薬害等に関する注意事項

- 使用量に合わせ秤量し、使いきる。
- 散布に当たっては、田水深を3cm以上の湛水状態とし、散布後少なくとも3~4日間は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしない。なお、極端な漏水田での使用はさける。
- 本剤の使用適期は通常出穂20日前頃であるが、稲の品種あるいは地域により前後することがあり、また多発時の散布は効果が劣る場合があるので、使用に当たっては病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意事項

- 眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。

水産動植物に対する注意事項

- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しない。

適用内容

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルトラニルを含む農薬の総使用回数
稲	紋枯病	3~4kg/10a	出穂30~10日前 但し、 収穫14日前まで	4回以内	湛水散布	4回以内
ねぎ	白絹病	4~6kg/10a	土寄せ時 但し、 収穫30日前まで		株元散布	5回以内(種子粉衣は1回以内、全面土壌散布及び株元散布は合計4回以内)
	オオシロカラカサタケ	4kg/10a	は種前		全面土壌散布	
葉しょうが	紋枯病		4kg/10a	植付時	1回	土壌表面散布
		生育期 但し、 収穫3日前まで		4回以内		

製品写真



最新の登録内容はこちら

