

フジワンモンカット粒剤

[イソプロチオラン・フルトラニル粒剤]

農林水産省登録 第16841号

有効成分 イソプロチオラン…12.0%
フルトラニル…7.0%

性 状 暗黄赤色細粒

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）
RACコード：殺菌[6]

危険物：- 有効年限：4年 包装：3kg×6

特長

- フジワンとモンカットを配剤したいもち病、紋枯病、稲こうじ病を同時防除できる水稻用殺菌剤である。
- 両成分とも稲体への吸収移行性に優れ、安定した防除効果が長期間持続する。
- 散布適期幅が広いいため、余裕をもって使用できる。

効果、薬害等に関する注意事項

- 育苗箱には使用しない。
- 使用量に合わせ秤量し、使いきる。
- 散布に当たっては、田水深を3cm以上の湛水状態とし、散布後少なくとも3～4日間は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしない。なお、極端な漏水田での使用はさける。
- 本剤の使用適期は通常出穂20日前頃であるが、稲の品種あるいは地域により前後することがあり、また、多発時の散布は効果が劣る場合があるので、使用に当たっては病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意事項

- 眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受ける。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン長袖の作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換する。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。

水産動植物に対する注意事項

- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しない。
- 散布後は河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意する。

適用内容

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イソプロチオランを含む農薬の総使用回数	フルトラニルを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病	3~4kg/10a	出穂30~10日前 但し、収穫30日前まで	2回以内	湛水散布	3回以内（移植前は1 回以内、本田では2 回以内）	4回以内
	稲こうじ病	4kg/10a					

製品写真



最新の登録内容はこちら

