

日農サイハロン水和剤

[シハロトリン水和剤]

農林水産省登録 第17010号

有効成分 シハロトリン…5.0%

性 状 類白色水和性粉末

安全性：劇物 危険物：- 有効年限：4年 包装：500g×20 RACコード：殺虫[3A]

特長

- 速効的なノックダウン効果と、強力な接触毒、食毒作用で高い殺虫効果を示す。

効果、薬害等に関する注意事項

- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意する。
 - ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにする。
 - 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさける。
 - 関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。
- みかん及び茶での散布の場合によってハダニ類が増加することがあるので注意する。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意事項

- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意する。誤って飲みこんだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせる。使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受ける。
- 眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用する。また散布液を吸い込んだり、浴びたりしないよう注意し、作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼うがいをするとともに衣服を交換する。
- のど、鼻、皮膚などを刺激する場合、また、かゆみを生ずる場合があるので注意する。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
- 摘果等の作業の際は、農薬用マスク、手袋、長ズボン長袖の作業衣などを着用する。

水産動植物に対する注意事項

- 水産動植物（魚類）に強い影響を及ぼす恐れがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用する。養殖池周辺での使用は避ける。
- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないように適切に処理する。

適用内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シハロトリンを含む農薬の総使用回数
りんご	シンクイムシ類 ハマキムシ類 ギンモンハモグリガ モモチョッキリソウムシ	2000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
	キンモンホソガ アブラムシ類	2000～ 3000倍					
なし	シンクイムシ類 ハマキムシ類 ナシチビガ カメムシ類	2000倍					
	アブラムシ類	2000～ 3000倍					
もも	シンクイムシ類 モモハモグリガ	2000倍					
	アブラムシ類	2000～ 3000倍					
みかん	ミカンハモグリガ チャノキイロアザミウマ アブラムシ類 カメムシ類	2000倍		収穫21日前まで			
キャベツ	アオムシ コナガ アブラムシ類 ヨトウムシ タマナギンウワバ	2000～ 3000倍		収穫7日前まで			
はくさい				収穫14日前まで			
だいこん	アオムシ コナガ アブラムシ類 ヨトウムシ			収穫21日前まで			
レタス	アブラムシ類		収穫14日前まで				
きゅうり	アブラムシ類 オンシツコナジラミ		2000倍	収穫前日まで			
なす	アブラムシ類						
ばれいしょ	テントウムシダマシ類		2000～ 4000倍	収穫7日前まで			
	アブラムシ類						
てんさい	ヨトウムシ		4回以内	4回以内			
茶	チャノコカクモンハマキ チャノホソガ チャノキイロアザミウマ コミカンアブラムシ チャノミドリヒメヨコバイ ヨモギエダシャク チャハマキ		2000倍	200～ 400ℓ /10a	摘採7日前まで	1回	1回
たばこ	タバコガ ヨトウムシ	2000～ 3000倍	25～ 180ℓ /10a	収穫10日前まで	2回以内	2回以内	

製品写真



最新の登録内容はこちら

