

ツインバリアー水和剤

[キャプタン・ピコキシストロピン水和剤]

農林水産省登録 第24465号

有効成分 キャプタン…50.0%
ピコキシストロピン…7.0%

性状 類白色水和性粉末 45μm以下

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）
RACコード：殺菌[M4][11]

危険物：- 有効年限：3年 包装：500g×20

特長

- 幅広い殺菌スペクトルを有するピコキシストロピンと、りんご病害防除で実績のあるキャプタンを配合したりんご向け総合殺菌剤です。
- 作用性の異なる2つの有効成分で安定した効果を示します。
- Qol耐性菌（黒星病菌、炭疽病菌）に対しても有効です。
- 幅広い病害に対して効果を示し、収穫前日まで使用可能であるため、生育期後半の防除に適します。

効果、薬害等に関する注意事項

- ボルドー液、石灰硫黄合剤等のアルカリ性薬剤及びマシン油乳剤との混用はさける。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤と組み合わせて輪番で使用する。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意事項

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意する。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
- 散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡、農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用する。作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼うがいをするとともに衣服を交換する。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさける。
- 夏期高温時の使用をさける。

水産動植物に対する注意事項

- 水産動植物（魚類、甲殻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

適用内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キャプタンを含む農薬の総使用回数	ピコキシストロビンを含む農薬の総使用回数
りんご	黒星病 斑点落葉病 褐斑病 炭疽病 すす点病 すす斑病 輪紋病	1000倍	200～ 700ℓ/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	6回以内	3回以内
もも	縮葉病			発芽前			4回以内	

製品写真



最新の登録内容はこちら

