

オーケストラスタークル エアー

[ジノテフラン・ベンズピリモキサン水和剤]

農林水産省登録 第24530号
有効成分 ジノテフラン…9.0%
ベンズピリモキサン…10.0%
性 状 類白色水和性粘稠懸濁液体

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称） 危険物：- 有効年限：3年 包装：1ℓ×12、10ℓ×1 RACコード：殺虫[4A][-]

特長

- ウンカ類に高い効果を示すオーケストラ、カメムシ類に優れた効果のスタークルを配合した水稻用殺虫剤です。
- オーケストラは、新規作用性を有し、既存剤に抵抗性が発達したウンカ類に有効です。
- スタークルは、カメムシ類に対して殺虫効果と吸汁阻害効果があり、斑点米被害を阻止します。

効果、薬害等に関する注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- 使用の際は、薬液をよく攪拌して均一な状態にして使用する。また、希釈する場合は、所定量の水に加えてから十分攪拌する。
- 無人航空機による散布に使用する場合は次の注意を守る。
 - 散布液調製後はできるだけ速やかに散布する。
 - 散布は各散布機種種の散布基準に従って実施する。
 - 散布機種種に適合した散布装置を使用する。
 - 散布中、薬液が漏れないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行う。
 - 散布薬液の飛散によって動植物及び自動車の塗装やカラートタンの塗装等へ影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意する。
 - 散布終了後は次の事項を守る。
 - 使用後の空の容器は放置せず、適切に処理する。
 - 機体散布装置は十分洗浄し薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理する。
- 蚕に対して影響を及ぼすおそれがあるので、養蚕で使用する桑葉にかからないようにする。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意事項

- ア 農薬使用者に係る注意事項
 - 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン長袖の作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換する。
 - 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
 - かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
- イ 蜜蜂に係る注意事項

- 1)ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにする。無人航空機による散布でそれらに飛散するおそれがある場合には使用しない。
- 2)関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。

■ 水産動植物に対する注意事項

- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しない。
- 無人航空機による散布で使用する場合は、河川、養殖池等に飛散しないよう特に注意する。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

適用内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農業の総使用回数	ベンズピリモキサンの総使用回数
稲	ウンカ類 カメムシ類	1000倍	60~150 ℓ/10a	収穫7日 前まで	3回以内	散布	4回以内 (育苗箱 への処理 及び側条 施用は合 計1回以 内、本田 での散 布、空中 散布、無 人航空機 散布は合 計3回以 内)	3回以内
		8倍	0.8ℓ/10a			無人航空 機による 散布		

製品写真



最新の登録内容はこちら

