

オーケストラロムダンモンカット粉剤DL

[テブフェノジド・ベンズピリモキサン・フルトラニル粉剤]

農林水産省登録	第24531号
有効成分	テブフェノジド…0.75% ベンズピリモキサン…0.50% フルトラニル…2.0%
性状	類白色粉末45μm以下

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称） 危険物：- 有効年限：5年 包装：3kg×8
RACコード：殺虫[18]殺菌[7]

特長

- オーケストラ、ロムダンおよびモンカットの混合剤で、水稻中期主要害虫のウンカ類、チョウ目類および紋枯病を同時防除できます。
- オーケストラは、新規作用性を有し、既存剤に抵抗性が発達したウンカ類に有効です。
- ロムダンは、コブノメイガ等のチョウ目害虫に優れた防除効果を示します。
- モンカットは、稲体への浸透移行性を有し、紋枯病に対して予防、治療効果を発揮します。
- オーケストラおよびロムダンは、天敵などの有用昆虫に対して影響の少ない薬剤です。

効果、薬害等に関する注意事項

- 使用量に合わせ秤量し、使いきる。
- 本剤はできるだけ飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ見かけ比重がやや大きく、流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を一目盛程度しぼって散布する。
- 本剤はウンカ類の成虫を直接殺す作用がないので、幼虫主体の時期に散布するのが望ましい。また、その場合、薬剤散布後も幼虫は直ちに死亡せず、死亡までに数日を要するので十分留意する。
- ウンカ類成虫の防除を必要とする場合には、成虫に有効な薬剤と組み合わせて使用する。
- 蚕に対して長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、桑に付着するおそれのある場所では使用しない。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意事項

- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン長袖の作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換する。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。

水産動植物に対する注意事項

- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しない。
- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
- 散布後は水管理に注意する。

適用内容

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テブフェノジドを含む農薬の総使用回数	ベンズピリモキサンの総使用回数	フルトラニルを含む農薬の総使用回数
稲	ウンカ類幼虫 コブノメイガ ツマグロヨコバイ幼虫 ニカメイチュウ イネツトムシ 紋枯病	3~ 4kg/10a	収穫14 日前まで	2回以内	散布	2回以内	3回以内	4回以内

製品写真



最新の登録内容はこちら

