

ナレート水和剤

[オキシリニック酸・有機銅水和剤]

農林水産省登録 第17960号

有効成分 オキシリニック酸…10.0%
8-ヒドロキシキノリン銅…50.0%

性状 黄緑色水和性粉末 45μm以下

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称） 危険物：- 有効年限：4年 包装：500g×20
RACコード：殺菌[31][M1]

特長

- 軟腐病などの細菌病に優れた効果を示すオキシリニック酸と広範囲の病害に有効な有機銅の2成分を含有する。
- 細菌性病害等に高い防除効果を示し、安定した効果が長期間持続する。
- 作用性の異なる成分を配剤しているため既存の薬剤耐性菌にも安定した効果を示す。

効果、薬害等に関する注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- 石灰硫黄合剤との混用は薬害のおそれがあるのでさける。
- はくさい、レタス、非結球レタス、キャベツに対して使用する場合、収穫間際の散布では収穫物に汚れを生じることがあるので注意する。
- はくさいたまねぎレタス非結球レタスキャベツブロッコリーだいこんねぎの軟腐病、はくさいのべと病、レタス非結球レタスの斑点細菌病及び腐敗病並びににんにくの春腐病に使用する場合、発病後の散布では効果が劣る場合があるので、発病前あるいは発病初期に予防的に散布する。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意事項

- 誤飲、誤食などのないよう注意する。
- 眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 皮膚に対して弱い刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意する。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン長袖の作業衣などを着用する。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。

水産動植物に対する注意事項

- 水産動植物（魚類）に強い影響を及ぼす恐れがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用する。養殖池周辺での使用は避ける。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具の洗浄水は、河川等に流さない。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

適用内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	オキシリニック酸を含む農薬の総使用回数	有機銅を含む農薬の総使用回数	
ばれいしょ	軟腐病	600～1000倍	100～300ℓ/10a	収穫14日前まで	5回以内	散布	5回以内 (種いも浸漬は1回以内)	5回以内	
キャベツ	黒腐病	800倍			3回以内		3回以内	3回以内	3回以内
	軟腐病	800～1000倍			2回以内			2回以内	
ブロッコリー	軟腐病	1000倍		収穫30日前まで	3回以内		3回以内	5回以内	
はくさい		600～1000倍							800倍
だいこん	軟腐病	800～1000倍		収穫21日前まで	3回以内		5回以内	3回以内	
たまねぎ	べと病	800倍		収穫14日前まで					
ねぎ	軟腐病 べと病	1000倍		収穫21日前まで	2回以内		2回以内	5回以内	
レタス	軟腐病 腐敗病 斑点細菌病 すそ枯病 べと病			収穫30日前まで					
非結球レタス									
こんにゃく	腐敗病	800～1000倍		収穫21日前まで	5回以内		6回以内 (種いもへの吹き付けは1回以内、植付後は5回以内)	8回以内	
にんにく	春腐病	1000倍		収穫7日前まで	2回以内		2回以内	5回以内	

製品写真



最新の登録内容はこちら

