

モンカットプラスフロアブル

[フルジオキシニル・フルトラニル水和剤]

農林水産省登録 第24596号
有効成分 フルジオキシニル…7.3%
フルトラニル…18.2%
性状 類白色水和性粘稠懸濁液体

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称） 危険物：- 有効年限：3年 包装：1ℓ×12
RACコード：殺菌[12][7]

特長

- 黒あざ病防除の定番であるフルトラニルと、そうか病に高い効果を示すフルジオキシニルの混合殺菌剤です。
- 2つの有効成分により、黒あざ病に加え問題病害であるそうか病に対しても有効です。
- フロアブル製剤なので秤量が簡単で、混合剤であるため混用に係る面倒な作業も軽減されます。

効果、薬害等に関する注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 所定濃度の薬液で種いも浸漬又は散布し、風乾後植付ける。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意事項

- 種いも浸漬の際は不浸透性手袋などを着用する。

水産動植物に対する注意事項

- 浸漬後の薬液は、河川等に流さず、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

適用内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルジオキシニルを含む農薬の総使用回数	フルトラニルを含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	そうか病 黒あざ病	100～ 200倍	—	植付前	1回	種いも瞬間浸漬	1回	1回
			種いも 100kg当り3ℓ			種いも散布		
	黒あざ病	20倍	種いも 100kg当り200～ 300ml					

製品写真



最新の登録内容はこちら

