

# ブイゲットパディートフロアブル

[シアントラニリプロール・チアジニル水和剤]

農林水産省登録	第24711号
有効成分	シアントラニリプロール… 1.87% チアジニル…30.0%
性状	淡褐色～褐色水和性粘稠懸濁液 体

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）  
×20 RACコード：殺虫[28]殺菌[P3]

危険物：- 有効年限：3年 包装：500ml

## 特長

- 薬液を調製し、ジョウロや灌水装置で散布するタイプの水稲育苗箱処理が可能です。いもち病および水稲主要害虫を同時防除できます。
- ブイゲットは、稲をいもち病、細菌病にかかり難くする作用性（病害防除機能の増強）を有し、安定した効果を示します。また、耐性菌出現リスクが低く、既存薬剤の耐性菌にも有効です。
- パディートはニカメイチュウのようなチョウ目害虫に対して、高い効果と優れた効果持続性を発揮します。また、既存剤に対して抵抗性の発達したイネミズゾウムシやイネドロオイムシに対しても高い防除効果を発揮します。

## 効果、薬害等に関する注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- 育苗箱の上から所定量の希釈薬液を均一に灌注する。
- 軟弱徒長苗、むれ苗又は苗の生育が不良な場合は、薬害を生じるおそれがあるので注意する。
- きく等の他作物に影響を及ぼすおそれがあるので、その他の作物の栽培予定がある場所では使用しない。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

## 安全使用上の注意事項

- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。

## 水産動植物に対する注意事項

- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、本剤を使用した苗は養魚田に移植しない。
- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意する。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器等は、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

適用内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリブロールを含む農薬の総使用回数	チアジニルを含む農薬の総使用回数
稲（箱育苗）	いもち病 イネミズゾウムシ イネドロオウムシ	25～50倍	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ) 1 箱当り500ml	移植3日 前～移植 当日	1回	灌注	1回	3回以内 (移植時 までの処 理は1回 以内、本 田での散 布は2回 以内)
	ニカメイチュウ フタオビコヤガ	25倍						

製品写真



最新の登録内容はこちら

