

マッチョフロアブル

[ピコキシストロビン水和剤]

農林水産省登録 第23805号

有効成分 ピコキシストロビン…22.5%

性状 類白色水和性粘稠懸濁液体

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）
×20 RACコード：殺菌[11]

危険物：- 有効年限：4年 包装：500ml

特長

- 浸達性、浸透移行性が高く、耐雨性や効果持続性に優れるため、安定した防除効果を発揮します。
- かんきつに対する薬害葉斑のリスクが少なく、収穫前日数も3日と短く、使いやすい薬剤です。
- 汚れの心配が少なく、希釈しやすいフロアブル剤です。

効果、薬害等に関する注意事項

- 使用前によく振ってから使用する。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤と組み合わせて輪番で使用する。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意事項

- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗する。

水産動植物に対する注意事項

- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

適用内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピコキシ ストロピ ンを含む 農薬の総 使用回数
かんきつ	灰色かび病 黒点病 そうか病	2000倍	200～ 700ℓ/10a	収穫3日 前まで	3回以内	散布	3回以内

製品写真



最新の登録内容はこちら

