

適用内容

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニプロールを含む農薬の総使用回数	チアジニルを含む農薬の総使用回数
稲（箱育苗）	いもち病	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ) 1 箱当り50g	は種前	1回	本剤の所定量を育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。	1回	3回以内 (移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内)
	いもち病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ		は種時 (覆土前) ～移植当日		本剤の所定量を育苗箱の上から均一に散布する。		
	ニカメイチュウ フタオビコヤガイ イナゴ類		移植当日		本剤の所定量を育苗箱の上から均一に散布する。		
	いもち病	高密度には種する場合は 1kg/10a（育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ) 1 箱当り50～100g)	は種前		本剤の所定量を育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。		
	いもち病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ		は種時 (覆土前) ～移植当日		本剤の所定量を育苗箱の上から均一に散布する。		
	ニカメイチュウ フタオビコヤガイ イナゴ類		移植当日		本剤の所定量を育苗箱の上から均一に散布する。		
稲	いもち病	1kg/10a	移植時		側条施用		3回以内 (直播では種時又は移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内)

製品写真



最新の登録内容はこちら

