

バッチレート（新登録：第24967号）

[有機銅塗布剤]

農林水産省登録 第24967号

有効成分 8-ヒドロキシキノリン銅…5.0%

性 状 黄緑色～暗黄色粘稠懸濁液体

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称） 危険物：- 有効年限：3年 包装：（200g×10チューブ）×5、1kg×12 RACコード：殺菌[M1]

特長

- 被害樹（病患部）の削り取り後や剪定後の切り口にそのまま塗布する有機銅剤であり、傷口や切口のゆ合を促進する。
- 胴枯病等の枝幹病害の病患部削り取り後の塗布により再発を防止する。

効果、薬害等に関する注意事項

- 使用量に合わせ秤量し、使いきる。
- 本剤は貯蔵中にゲル状物質を生成することがあるので、使用に際しては、均一な状態にする。
- 本剤の使用に当たっては、乾燥による固まりを防ぐため、ふたを外した状態で放置せず確実に装着する。
- 使用直前によく攪拌し原液をそのままハケ等で塗布する。
- りんご、なしに対しては病斑を見つけ次第病患部を大きめに完全に削り取りその傷あと及びその周辺に十分塗布する。又、せん定、整枝時や環状はく皮等による切口に予防的に塗布する。
- 使用後のハケはそのまま放置せず、水でよく洗う。
- かきに使用する場合、富有、松本早生富有などでは効果が劣る場合があるので注意する。
- うめでは1年生切り戻し部への塗布により、枯れ込みが助長される場合があるので注意する。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意事項

- 街路、公園等で使用する場合は、使用中及び使用後（少なくとも使用当日）に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。

水産動植物に対する注意事項

- 容器の洗浄水、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

適用内容

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
りんご	銀葉病 赤衣病 腐らん病 傷口のゆ合促進	原液	剪定時及び病患部削り取り直後	3回以内	剪定枝の切口、病患部の削除あとに塗布	7回以内（塗布は3回以内、散布は4回以内）
なし	胴枯病 傷口のゆ合促進					12回以内（塗布は3回以内、散布は9回以内）
ぶどう	傷口のゆ合促進					7回以内（塗布は3回以内、散布は4回以内（但し、開花後は1回以内））
かんきつ （みかんを除く）	傷口のゆ合促進 幹腐病					3回以内
みかん				5回以内		
かき もも	3回以内			8回以内（塗布は3回以内、散布は5回以内）		
うめ				3回以内		
おうとう				6回以内（塗布は3回以内、散布は3回以内）		
マンゴー				1回		
樹木類 （あじさい、えぞまつ（苗木）、とどまつ（苗木）、せんりょう、まつを除く）	—			—		
あじさい	5回以内			5回以内		
えぞまつ（苗木） とどまつ（苗木）	2回以内			2回以内		
せんりょう	8回以内			8回以内		
まつ	4回以内			4回以内		

製品写真



最新の登録内容はこちら

