

# フェニックスマストフロアブル

[ジクロロメゾチアズ・フルベンジアミド水和剤]

農林水産省登録 第24959号

## 有効成分

ジクロロメゾチアズ…9.2%  
フルベンジアミド…18.0%

## 性状

淡黄緑色～黄色水和性粘稠懸濁液体

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称） 危険物：- 有効年限：3年 包装：500ml  
×20 商標：フェニックスマスト®は日本農薬の登録商標です。 RACコード：殺虫[4E][28]

## 特長

- 【2つの有効成分】新規作用性を有するジクロロメゾチアズと大型チョウ目害虫に優れた効果を示すフルベンジアミドの混合剤です。
- 【特徴的な殺虫スペクトラム】園芸分野で発生するチョウ目、コウチュウ目、ハエ目に対して高い効果を示します。
- 【既存剤抵抗性害虫への効果】既存剤に対する感受性が低下したコナガに対しても高い殺虫活性を示します。
- 【問題害虫への高い効果】昨今発生が増加しているオオタバコガをはじめとする大型チョウ目に対して速やかに食害を抑制し、長い効果を示します。

## 効果、薬害等に関する注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- 使用前によく振る。
- 間引き菜、つまみ菜に使用しない。
- 蚕に対して影響を及ぼすおそれがあるので、養蚕で使用する桑葉にかからないようにする。
- 散布薬液の調製容器、散布器具などは水でよく洗浄する。また、洗浄した廃液は河川等に流さない。
- 空容器等は環境に影響を与えないよう適切に処理する。
- 本剤は自動車や壁などの塗装面に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意する。
- 本剤は衣服（白衣）などに散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意する。
- 本剤の使用にあたっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受ける事が望ましい。

## 安全使用上の注意事項

- アレルギー性反応を起こすおそれがある。

## 水産動植物に対する注意事項

- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器等は、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

適用内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジクロロメゾチアズを含む農業の総使用回数	フルベンジアミドを含む農業の総使用回数	
キャベツ	ハスモンヨトウ ウワバ類 シロイチモジヨトウ ヨトウムシ コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ	2000倍	100～ 300ℓ/10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内	4回以内 (灌注は 1回以 内、散布 及び無人 航空機散 布は合計 3回以 内)	
はくさい	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ								
だいこん	コナガ ハスモンヨトウ キスジノミハムシ			収穫7日 前まで					2回以内
ブロッコリー	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ			収穫3日 前まで					3回以内 (灌注は 1回以 内、散布 及び無人 航空機散 布は合計 2回以 内)
レタス	ヨトウムシ オオタバコガ ナモグリバエ			収穫前日 まで					2回以内
非結球レタス									2回以内

製品写真



最新の登録内容はこちら

