

日農ロムダンフロアブル

[テブフェノジド水和剤]

農林水産省登録 第19000号

有効成分 テブフェノジド…20.0%

性状 類白色水和性粘稠懸濁液体

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称） 危険物：- 有効年限：5年 包装：500ml×20、335ml×20 RACコード：殺虫[18]

特長

- チョウ目害虫に対して脱皮促進作用を示すタイプの昆虫成長制御剤（IGR）である。
- 幼虫の生育齢期にかかわらず高い効果を示す。
- フロアブル製剤なので薬液の調製が簡単で、作物への汚れも少ない。

効果、薬害等に関する注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節する。
- カラー及び花はすに使用する場合は、湛水状態で使用しない。また、使用后14日間は入水しない。
- 蚕に対して長期間毒性があるので、養蚕地帯等では使用しない。また、これら以外の場所でも付近に桑園がある場合は飛散してかからないように十分注意して散布する。
- 無人航空機による散布を行う場合には、次の注意事項を遵守する。
 - 散布機種 of 散布基準に従って行う。
 - 散布機種に適合した散布装置を使用する。
 - 散布中に薬液の漏れがないように、事前に機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行う。
 - 散布液の飛散によって自動車の塗装やカラートタンの塗装等へ影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意する。
 - 散布終了後、機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理する。また使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄する。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意事項

- 眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗する。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。

適用内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テブフェノジドを含む農薬の総使用回数		
ぶどう 小粒核果類	ケムシ類	3000倍	200~700ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内		
りんご	ハマキムシ類 キリガ類	1500~3000倍							
	ケムシ類 シャクトリムシ類	3000倍							
おうとう	ハマキムシ類			収穫7日前まで					
もも ネクタリン	ハマキムシ類 ケムシ類				3回以内				
なし		3回以内							
マンゴー	ドクガ類 ハマキムシ類	2000倍	収穫21日前まで	2回以内	散布	2回以内			
はくさい	ハスモンヨトウ アオムシ	2000~4000倍	収穫前日まで						
キャベツ	シロイチモジヨトウ	2000倍							
レタス	ハスモンヨトウ オオタバコガ	2000~4000倍							
いちご	ハスモンヨトウ	2000倍	100~300ℓ/10a				収穫3日前まで	3回以内	3回以内
れんこん							収穫21日前まで	2回以内	2回以内
ほうれんそう				収穫7日前まで	3回以内	3回以内			
ねぎ				シロイチモジヨトウ	2000~4000倍	2回以内	2回以内		
にんじん	ヨトウムシ	2000~3000倍							
		キアゲハ	2000~3000倍	3回以内	3回以内				
しょうが さといも さといも(葉柄)	ハスモンヨトウ	2000倍	収穫前日まで						
そば			収穫21日前まで			2回以内	2回以内		
だいず			収穫14日前まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内			
かんしょ	2000~3000倍	0.8ℓ/10a	収穫7日前まで						
			8倍	2回以内	散布	2回以内			
てんさい	ヨトウムシ	2000倍	100~300ℓ/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内		

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テブフェノジドを含む農薬の総使用回数
茶	チャノコカクモンハマキ チャハマキ	1000倍	200~400ℓ/10a	摘採14日前まで	2回以内		2回以内
	ヨモギエダシャク チャノホソガ	1000~2000倍					
花き類・観葉植物 (きくを除く)	シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ	1000倍	100~300ℓ/10a	発生初期	5回以内	散布	5回以内
きく	シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ オオタバコガ						
とうき	キアゲハ						
樹木類	ケムシ類	2000~3000倍	200~700ℓ/10a				

製品写真



最新の登録内容はこちら

