

モンカットファイン粉剤 20DL

[フルトラニル粉剤]

農林水産省登録	第19013号
有効成分	フルトラニル…2.0%
性状	類白色粉末 45μm以下 浮遊性指数 20以下

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称） 危険物：- 有効年限：5年 包装：3kg×8
RACコード：殺菌[7]

特長

- 稲体への浸透移行性に優れ、稲紋枯病に対して優れた効果が長期間持続する。
- 稲紋枯病に対して菌糸生育阻止、侵入菌糸形成阻止の力が強いいため、予防効果とともに感染後の治療効果も有する。
- ねぎ白絹病に対して、土寄せ時の株元散布により優れた防除効果を示す。

効果、薬害等に関する注意事項

- 使用量に合わせ秤量し、使いきる。
- 本剤は飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ見かけ比重がやや大きく、流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を一目盛程度しぼって散布する。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 本剤の使用にあたっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意事項

- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 使用の際は農薬用マスクなどを着用する。使用後はうがいをするとともに洗眼する。

水産動植物に対する注意事項

- 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しない。
- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
- 散布後は水管理に注意する。

適用内容

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルトラニルを含む農薬の総使用回数
稲	紋枯病 疑似紋枯症 (褐色菌核病菌) 疑似紋枯症 (褐色紋枯病菌) 疑似紋枯症 (赤色菌核病菌)	3~4kg/10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	4回以内
ねぎ	オオシロカラカサタケ	15kg/10a	は種前		全面土壌散布	5回以内 (種子粉衣は1回 以内、全面土壌散 布及び株元散布は 合計4回以内)
	白絹病	10~15kg/10a	土寄せ時 但し、 収穫30日前まで	株元散布		
こんにゃく		3kg/10a	培土時 但し、 収穫30日前まで	1回		2回以内
キャベツ	苗立枯病 (リゾクトニア菌)	20kg/10a	は種時~ 定植前	2回以内	土壌混和	7回以内 (種子粉衣は1回 以内、定植前の土 壌混和は2回以 内、散布は4回以 内)

製品写真



最新の登録内容はこちら

