

日農ロムダンエアー

[テブフェノジド水和剤]

農林水産省登録 第19514号

有効成分 テブフェノジド…20.0%

性状 類白色水和性粘稠懸濁液体

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称） 危険物：- 有効年限：3年 包装：5ℓ×4 RAC
コード：殺虫[18]

特長

- 昆虫成長制御剤（IGR）で、チョウ目害虫に対して脱皮促進作用を示す。
- 無人ヘリコプター用専用薬剤である。
- 天敵類に影響が少ない。

効果、薬害等に関する注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- 散布は各散布機種種の散布基準に従って実施する。
- 微量散布装置以外の散布器具は使用しない。
- 散布機種種に適合した散布装置を使用する。
- 散布中、薬液の漏れないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行う。
- 散布薬液の飛散によって自動車の塗装やカラートタンの塗装等へ影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意する。
- 散布終了後は次の事項を守る。
 1. 使用後の空容器は圃場などに放置せず適切に処理する。
 2. 機体の散布装置は十分洗浄し薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理する。
- 蚕に対して長期間毒性があるので、養蚕地帯では使用しない。これら以外の場所でも付近に桑園がある場合は飛散してかからないように十分注意して散布する。なお、使用にあたっては、事前に蚕業関係者と安全対策について十分協議する。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意事項

- 眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないように注意する。眼に入った場合には直ちに水洗する。

適用内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テブフェノジドを含む農薬の総使用回数
稲	コブノメイガ ニカメイチュウ	16倍	800mℓ/10a	収穫21日前まで	2回以内	無人ヘリコプターによる散布	2回以内
だいず	ハスモンヨトウ			収穫14日前まで	3回以内		3回以内

製品写真



最新の登録内容はこちら

