

# アプロードエースフロアブル

[フェンピロキシメート・ブプロフェジン水和剤]

農林水産省登録 第20106号

有効成分 フェンピロキシメート…4.0%  
ブプロフェジン…20.0%

性状 類白色水和性粘稠懸濁液体

安全性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）  
500ml×20 RACコード：殺虫[21A][16]

危険物：- 有効年限：5年 包装：

## 特長

- 本剤はコナジラミ、カイガラムシに対して補完的な作用を示す、アプロード（ブプロフェジン）とダニトロン（フェンピロキシメート）の混合剤である。
- フロアブル製剤のため薬剤の秤量がしやすく、作物に対する汚れが少ない。
- 殺虫剤分類：21A, 16

## 効果、薬害等に関する注意事項

- 使用前に容器を軽く振る。
- 本剤の散布適期は、幼虫が優占する時期であり、多発時及び成虫が多い時期には直ちに密度を低下させることができないので、殺成虫効果があり速効性の薬剤と組み合わせて使用することが望ましい。
- なしの萌芽期から新梢伸長期に使用する場合、薬液が乾きにくい条件下では、葉に褐色斑点等の薬害が生じるおそれがあるので、注意して使用する。但し、施設栽培ではこの時期での使用をさける。
- 蚕に長期間毒性があるので、桑葉にかからないように注意する。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

## 安全使用上の注意事項

- 誤飲などのないよう注意する。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせる。使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受ける。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意する。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン長袖の作業衣などを着用する。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼する。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。

### ■ 水産動植物に対する注意事項

- 水産動植物（魚類）に強い影響を及ぼす恐れがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用する。養殖池周辺での使用は避ける。
- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

適用内容

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フェンピロキシメートを含む農薬の総使用回数	プロフェジンを含む農薬の総使用回数	
みかん	カイガラムシ類	1000倍	200～700ℓ/10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内	3回以内	
	ミカンサビダニ	1000～2000倍							
	チャノホコリダニ	2000倍							
かんきつ (みかんを除く)	カイガラムシ類	1000倍		収穫45日前まで					
	ミカンサビダニ	1000～2000倍							
	チャノホコリダニ	2000倍							
なし	カイガラムシ類 ニセナンサビダニ	1000倍		100～300ℓ/10a	収穫30日前まで		1回	1回	2回以内
ぶどう	カイガラムシ類 ブドウハモグリダニ				収穫7日前まで		2回以内	2回以内	
おうとう ネクタリン うめ	カイガラムシ類				収穫14日前まで		1回	1回	3回以内
もも					2回以内		2回以内	2回以内	2回以内
すもも									
いちじく									
キウイフルーツ	カイガラムシ類 キウイヒメヨコバイ		1回		1回	2回以内			
トマト	コナジラミ類		1000～2000倍		収穫前日まで	3回以内	3回以内	3回以内	
	トマトサビダニ		1000倍						
なす	コナジラミ類		1000～2000倍			2回以内	2回以内	2回以内	
	チャノホコリダニ	1000倍							
とうがらし類	コナジラミ類	1000～2000倍	3回以内	3回以内		3回以内			
きゅうり									
すいか メロン									
茶	カイガラムシ類	1000ℓ/10a	200～400ℓ/10a	摘採14日前まで	2回以内	2回以内	2回以内		
	チャノミドリヒメヨコバイ チャノホソガ チャノホコリダニ チャノナガサビダニ チャトゲコナジラミ								
ガーベラ	コナジラミ類	100～300ℓ/10a	発生初期	2回以内	2回以内	6回以内			
しきみ	シキミハリナガフシダニ	100～700ℓ/10a							
ポインセチア	コナジラミ類	100～300ℓ/10a							

製品写真



最新の登録内容はこちら

